



Olympiades
québécoises
des métiers et des
technologies

ORDONNANCE INDIVIDUELLE STANDARDISÉE POUR INSULINOTHÉRAPIE S/C

INSULINE À DOSE(S) RÉGULIÈRE(S) À MOMENT(S) FIXE(S)				
INSULINE(S)	AVANT DÉJEUNER	AVANT DÎNER	AVANT SOUPER	AU COUCHER

ÉCHELLE D'ANALOGUE DE L'INSULINE À ACTION ULTRARAPIDE (NOVORAPID OU HUMALOG) PAR VOIE SOUS-CUTANÉE			
<input type="checkbox"/> Échelle de base de Novolin Toronto ou Humulin R par voie sous-cutanée		<input type="checkbox"/> Échelle personnalisée de Novolin Toronto ou Humulin R par voie sous-cutanée	
<u>Glycémie capillaire</u> (mmol/L)	<u>dose</u> (unités)	<u>Glycémie capillaire</u> (mmol/L)	<u>dose</u> (unités)
≤6,9 →	0	≤6,9 →	_____
7-11 →	4	7-11 →	_____
11,1-14 →	6	11,1-14 →	_____
14,1-18 →	8	14,1-18 →	_____
18,1-20 →	10	18,1-20 →	_____
>20 →	12	>20 →	_____
<input type="checkbox"/> Donner $\frac{1}{2}$ dose au coucher <input type="checkbox"/> QID <input type="checkbox"/> BID (déjeuner et souper)		<input type="checkbox"/> Donner $\frac{1}{2}$ dose au coucher <input type="checkbox"/> QID <input type="checkbox"/> BID (déjeuner et souper)	
Signature du médecin : _____ Date : _____			