


PARAMÈTRES FONDAMENTAUX ET SURVEILLANCE DES USAGÉS ADULTES RECEVANTS DES OPIACÉS

Date : MAI 2023											Légendes												
Heure											<u>Effets secondaires</u>												
Narcotique reçu											0 = Aucun												
Dépresseur SNC											1 = Nausée/ vomissements												
Pulsation/ min											2 = Constipation												
Fréquence resp./min											3 = Prurit												
Ronflement O/N											4 = Autre *												
Resp. superficielle											<u>Échelle de somnolence</u>												
Saturation oxygène %											1 = Éveillé, alerte, orienté												
Oxygène (% ou L/min)											2 = Endormi, éveil facile												
Somnolence (1 à 4)											3 = Endormi, éveil avec stimulation intense												
Effets secondaires (0 à 4)											4 = Ne répond pas à la douleur												
Échelle de douleur (0 à 10)											<u>Échelle de douleur</u>												
Température (B ou R)											0 = Aucune douleur												
Poids											2 = Légère												
Selles											4 = Gênante												
											6 = Pénible												
											8 = Sévère												
											10 = Insupportable												
											Initiale												

Signature	Initiale	Signature	Initiale	Signature	Initiale

Paramètres et fréquence de surveillance de la clientèle

Voie d'administration	Paramètres à évaluer	Fréquence d'évaluation
Voie PER OS Ou Intra rectale	<ul style="list-style-type: none"> État respiratoire État de conscience Intensité de la douleur PA et fréquence cardiaque PRN 	<ul style="list-style-type: none"> Avant l'administration de l'opiacé Au pic d'action soit 60 min. post administration et selon l'évaluation de l'infirmière
Voie sous cutanée Ou Intramusculaire	<ul style="list-style-type: none"> État respiratoire État de conscience Intensité de la douleur PA et fréquence cardiaque PRN 	<ul style="list-style-type: none"> Avant l'administration de l'opiacé Au pic d'action soit 30 min, Q 1 H X 2, Q 2 H X 1 post administration
Voie intraveineuse	<ul style="list-style-type: none"> État respiratoire État de conscience Intensité de la douleur Prendre le rythme cardiaque radial ou à l'apex Moniteur cardiaque ou télémétrie pour un minimum de 45 minutes 	<ul style="list-style-type: none"> Avant l'administration de l'opiacé Q 5 min X3 Q 15 min X2 Q 1 h X 2 Puis selon l'évaluation de l'infirmière

NOTES

Les paramètres sont à effectuer pendant les 24 premières heures et sont à recommencer de nouveau pour 24 heures quand il y a :

- Augmentation de dose de + de 50%
- Changement de molécule ou de voie d'administration
- Ajout d'un médicament dépresseur SNC

Pic et durée d'action

Médicament	Voie d'administration	Pic d'action (minutes)	Durée d'action (heures)
Codéine	PO	60 à 120	4 à 6
	Sous-Cutanée	Inconnu	4 à 6
	IM	30 à 60	4 à 6
Codéine LA 12H	PO	3 H	8 à 12
Fentanyl	IV	5 à 15	30 à 60
	Transdermique	Pour le 1 ^{er} timbre 24h	72
Hydromorphone (Dilaudid)	PO	60	4
	Sous-Cutanée	30	4
	IV	15 à 30	2 à 3
Mépéridine (Démérol)	PO	60 à 90	2 à 4
	IM et sous-cutanée	60 à 90	2 à 4
	IV	5 à 7	2 à 4
Morphine (Statex)	PO	60 à 120	4 à 12
	Sous-cutanée	30	4 à 5
	IV	15	4 à 5
Oxycodone (Supeudol)	PO	30 à 60	3 à 6
	IR	30 à 60	4 à 6